Gesetz- und Verordnungsblatt

für das Land Hessen · Teil I

1965	Ausgegeben zu Wiesbaden am 14. September 1965	Nr. 19

Tag	Inhalt:	Seite
9. 9. 65	Zehnte Polizeiverordnung zur Änderung der Polizeiverordnung über die Abgabebeschränkung von Acetazolamid und anderen Arzneimitteln *Ändert GVBl. II 354-17*	177

Zehnte Polizeiverordnung
zur Änderung der Polizeiverordnung über die Abgabebeschränkung von Acetazolamid und anderen Arzneimitteln*)

Vom 9. September 1965

Auf Grund des § 35 Abs. 1 und des § 40 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) vom 17. Dezember 1964 (GVBl. I S. 209) wird im Einvernehmen mit dem Minister des Innern für das Land Hessen verordnet:

Artikel 1

Die Anlage der Polizeiverordnung über die Abgabebeschränkung von Acetazolamid und anderen Arzneimitteln vom 7. Juli 1960 (GVBl. S. 98) in der Fassung der Polizeiverordnung zur Änderung der Polizeiverordnung über die Abgabebeschränkung von Acetazolamid und anderen Arzneimitteln vom 14. Dezember 1964 (GVBl. I S. 193) wird durch die Anlage zu dieser Verordnung ersetzt.

Anlage

Artikel 2

Diese Polizeiverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 9. September 1965

Der Hessische Minister für Arbeit, Volkswohlfahrt und Gesundheitswesen
Hemsath

*) Ändert GVBl. II 354-17

Anlage

5-Acetylamino-1,3,4-thiodiazol-2-sulfonamid und seine Salze (Acetazolamid)
Actinomycin C
Adrenocorticotropes Hypophysenvorderlappenhormon (ACTH)
(1-Aethinyl-cyclohexyl)-carbamat
Aethyl-β-chlorvinyl-aethinyl-carbinol (Ethchlorvynol)
3-Aethyl-5,5-dimethyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze
2-Aethyl-3,3-diphenyl-propen-(2)-ylamin und seine Salze
β-Aethyl-β-methyl-glutarimid
1-Aethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-on-3-carbonsäure, ihre Salze und Ester (Nalidixinsäure)
2-Aethyl-thioisonicotinsäureamid und seine Salze (Ethioamid)
Aldosteron
N-Alkyl-atropin und seine Salze (z. B. Atropinbrommethylat)
Allyl-isopropyl-acetylcarbamid und seine Salze
N-Allyl-normorphin und seine Salze
N-Allyl-3-oxy-morphinan und seine Salze
4-Amino-benzolsulfonamid (Sulfanilamid),4-Aminobenzolsulfocarbamid (Sulfanilcarbamid),4-Aminobenzolsulfonguanidid (Sulfanilguanidin) seine Salze und Derivate sowie deren Salze
— die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Gebrauchsanweisung vermerkt ist —
1-(4′-Aminobenzoyl)-2,2-dimethyl-3-diaethylaminopropanol-(1) und seine Salze (Dimethocain)
ε-Aminocapronsäure und ihre Salze
p-Amino-N-(2-diaethylaminoaethyl)-benzamid und seine Salze (Procainamid)
2-Amino-1-(3′,4′-dihydroxyphenyl)-aethanol-(1) und seine Salze (Noradrenalin)
— ausgenommen in Salben zum Gebrauch auf der äußeren Haut —
— Abgabe als Arzneifertigware auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf zulässig —
D-4-Amino-3-isoxazolidinon
4-Aminomethyl-benzolsulfonamid und seine Verbindungen
4-Amino-N^{10}-methyl-pteroyl-glutaminsäure und ihre Salze (Amethopterin)
6-Aminopenizillansäure-Derivate, soweit es sich handelt um:
6-[3′-(2″-Chlorphenyl)-5′-methyl-isoxazolyl-(4′)-carbamino]-penicillansäure und ihre Salze (Cloxacillin)
6-[(2,6-Dimethoxy-benzoyl)-amino]-penizillansäure und ihre Salze
6-[5′-Methyl-3′-phenyl-isoxazolyl-(4′)-carbamoyl]-penicillansäure und ihre Salze (Oxacillin)
6-Phenoxyacetylamino-penizillansäure und ihre Salze (Phenoxymethylpenizillin, Penizillin-V-Säure)
6-(α-Phenoxybutyramino)-penicillansäure und ihre Salze
6-(α-Phenoxypropionyl-amino)-penizillansäure und ihre Salze (Phenoxyaethylpenizillin)
6-Phenylacetylamino-penizillansäure, ihre Salze und Derivate sowie deren Salze (Benzylpenizillin, Penizillin G)
— die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist —
4-Amino-pteroyl-glutaminsäure und ihre Salze
4-Amino-salizylsäure (PAS), ihre Salze und Derivate sowie deren Salze
Aminosidin und seine Salze
Amphotericin B, auch als Komplex mit Natriumdesoxycholat

Bacitracin und seine Salze
— ausgenommen Zubereitungen zur örtlichen Anwendung auf Haut oder Schleimhaut, sofern sie je Stück abgeteilter Arzneiform (z. B. Tablette, Stylus) oder bei sonstigen Zubereitungen je Gramm oder Milliliter nicht mehr als 500 I. E. (= 9.1 mg) enthalten —
Barbitursäurederivate, ihre Salze und Molekülverbindungen
— Abgabe von Molekülverbindungen als Arzneispezialität in fester Form (z. B. Tabletten, Dragees) auf Verschreibung eines Dentisten zum Gebrauch in der Zahnheilkunde zulässig —
Benzaldehyd-thiosemicarbazon und seine Derivate
Benzaldehydzyanhydrin
N-Benzhydryl-N′-trans-cinnamyl-diaethylendiamin und seine Salze (Cinnarizin)
Benzilsäure-(2-diaethylaminoaethyl)-ester und seine Salze (Benactyzin)
Benzilsäure-(2-dimethylaminoaethyl)-ester und seine Salze
— ausgenommen zum inneren Gebrauch, soweit der Gehalt in der Einzelgabe 1 Milligramm nicht übersteigt —
Benzilsäure-tropinester und seine Salze
2-Benzolsulfonamido-5-methoxyaethoxy-pyrimidin und seine Salze
1,2,4-Benzothiadiazin-1,1-dioxyd-Abkömmlinge, soweit es sich handelt um:
3-Aethyl-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze (Aethiazidum)
3-Benzylthiomethyl-6-chlor-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze (Benzthiazid)
3-Benzyl-6-trifluormethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1 1-dioxyd und seine Salze
6-Chlor-3-chlormethyl-2-methyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd (Methyclothiazid)

6-Chlor-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze (Chlorothiazid)
6-Chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze (Hydrochlorothiazid)
3-Cyclopentylmethyl-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze (Cyclopenthiazid)
3-Dichlormethyl-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze (Trichlormethiazid)
3-Isobutyl-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze (Thiabutazid)
3-(α-Methylbenzyl)-6-chlor-7-sulfamyl)-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd
2-Methyl-3-(2,2,2-trifluoraethylthiomethyl)-6-chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze (Polythiazid)
3-β-Phenylaethyl-6-trifluormethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze
6-Trifluormethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze (Hydroflumethiazid)
d-Benzoylpseudotropincarbonsäure-propylester und seine Salze — nur zur Anwendung am Auge —
α-Benzoyl-triaethylamin (1-Phenyl-2-diaethylaminpropanon-1) und seine Salze (Diaethylpropion)
Benztropin und seine Salze
N-Benzyl-N',N''-dimethyl-guanidin (Bethanidin) und seine Salze
3-(N-Benzyl-N-methyl-amino)-propin-(1) (Pargylin) und seine Salze
1-Benzyl-2-(5'-methyl-3'-isoxazolylcarbonyl)-hydrazin und seine Salze (Isocarboxazid)
Bernsteinsäure-bis-(cholin-ester)-Salze
Biguanide und ihre Salze zur Diabetesbehandlung
2-[N-Bis-(2'-chloraethyl)-4-aminophenyl]-1-aminopropionsäure und ihre Salze
3-[N-Bis-(2'-chloraethyl)-4-aminophenyl]-buttersäure und ihre Salze (Chlorambucil)
N,N-Bis-(2-chloraethyl)-N',O-propylenphosphorsäureester-diamid (Cyclophosphamid)
N,N'-Bis-[(N''-o-chlorbenzyl-diaethyl)-2-aminoaethyl]-oxamid-Base und ihre Salze (Ambenoniumchlorid)
2,5-Bis-methoxyaethoxy-3,6-bis-aethylenimino-benzochinon-(1,4)
N,N-Bis-(N-methyl-N-phenyl-tert.-butylacetamido)-β-hydroxyaethylamin (Oxethazain) und seine Salze
Bis-[3,3'-(4-oxycumarinyl)]-essigsäure-aethylester
2,5-Bis-n-propoxy-3,6-bis-aethylenimino-benzochinon-(1,4)
N-(1-Brombenzyl)-N-aethyl-N,N-dimethyl-ammoniumsalze
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluor-aethan (Halothane)
Butan-1,4-diol-bis-(methansulfonat)
4'-Butylaminobenzoyl-2-dimethylamino-aethanol-(1) und seine Salze (Tetracain)
(4-Butylmercapto-benzhydryl)-(2-dimethylaminoaethyl)-sulfid und seine Salze (Captodiam)
2-Butyloxy-chinolin-4-carbonsäure-(2'-diaethylaminoaethylamid) und seine Salze (Cinchocain, Dibucain)

Calciferol (Vitamin D_2)
— ausgenommen Zubereitungen mit weniger als 5 mg je Tablette, Dragee, Kapsel, Milliliter u. dgl. —
2-Carbaethoxymercapto-1-methylimidazol (Carbimazol)
Carbaminoyl-cholin-Salze (Catbachol)
Carzinophilin, Carzinophilin A
Chinidin und seine Salze
7-Chlor-4-[4'-(N-aethyl-N-β-hydroxyaethylamino)-1'-methylbutylamino]-chinolin und seine Salze (Hydroxychloroquin)
7-Chlor-2-aethyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-6-sulfamyl-chinazolin und seine Salze (Quinethazon)
Chloralformamid
Chloramphenicol, seine Ester sowie deren Verbindungen (Chloromycetin)
— die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist —
1-p-Chlorbenzhydryl-4-(p-tert. butylbenzyl)-diaethylendiamin und seine Salze (Buclizin)
1-p-Chlorbenzhydryl-4-[2'-(2''-hydroxyaethoxy)-aethyl]-diaethylendiamin und seine Salze (Hydroxyzin)
1-p-Chlorbenzhydryl-4-m-methylbenzyldiaethylendiamin und seine Salze (Meclizin)
1-(4'-Chlorbenzhydryl)-4-methyldiaethylendiamin und seine Salze (Chlorcyclizin; Histachlorazine)
4-Chlorbenzol-1,3-disulfonamid und seine Salze
5-Chlor-2-benzoxazolinon und seine Salze (Chlorzoxazon)
7-Chlor-4-(4'-diaethylamino-1'-methylbutylamino)-chinolin und seine Salze (Chloroquin)
7-Chlor-4-(3'-diaethylaminomethyl-4'-hydroxyphenylamino)-chinolin und seine Salze (Amodiaquin)
7-Chlor-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on und seine Salze (Diazepam)
2-Chlor-9-(3'-dimethylamino-propyliden)-thiaxanthen (Transform) und seine Salze
4-Chlor-N-(2-furylmethyl)-5-sulfamoylanthranilsäure (Fursemid) und ihre Salze
2-Chlor-9-[3-(N'-β-hydroxyaethylpiperazino)-propyliden]-thiaxanthen und seine Salze
7-Chlor-2-methylamino-5-phenyl-1,4-benzodiazepin-4-oxyd und seine Salze
4-Chlorphenoxyessigsäure-isopropylhydrazid

2-(4′-Chlorphenoxy)-isobuttersäure-aethylester (Clofibrat)
2-(4′-Chlorphenyl)-3-methyl-4-meta-thiazanon und seine Salze (Chlormezanon)
Chlortetracyclin und seine Salze
— die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist —
Chlor-tri-(p-methoxyphenyl)-aethylen (Chlorotrianisen)
Cholecalciferol, auch als Molekülverbindung mit Cholesterin (Vitamin D_3)
— ausgenommen Zubereitungen mit weniger als 5 mg je Tablette, Dragee, Kapsel, Milliliter u. dgl. —
Colchicum-Alkaloide, auch hydrierte, und ihre Salze
Colistin und seine Salze
Convallaria-Glykoside
Cortisone, soweit es sich um folgende Verbindungen handelt:
1-Dehydro-11-dehydro-17-hydroxy-corticosteron und seine Ester (Dehydrocortison, Prednison)
1-Dehydro-6,9-difluor-16,17-dihydroxy-corticosteron und seine Aether (6,9-Difluor-16-hydroxy-prednisolon)
1-Dehyro-6,9-difluor-16-methyl-17-hydroxy-corticosteron, seine Ester und deren Salze (6,9-Difluor-16-methyl-prednisolon, Flumethason)
1-Dehydro-9-fluor-16, 17-dihydroxy-corticosteron, seine Aether und Ester (9-Fluor-16-oxy-prednisolon)
1-Dehydro-6-fluor-16-methyl-corticosteron, seine Ester und deren Salze
1-Dehydro-6-fluor-16-methyl-17-hydroxy-corticosteron und seine Ester (6-Fluor-16-methyl-prednisolon)
1-Dehydro-9-fluor-16-methyl-17-hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze (9-Fluor-16-methyl-prednisolon, Betamethason, Dexamethason)
1-Dehydro-17-hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze (Dehydro-hydrocortison, Prednisolon)
11-Dehydro-17-hydroxy-corticosteron und seine Ester (Cortison, Compound E)
1-Dehydro-6-methyl-9-fluor-17-hydroxy-21-desoxy-corticosteron (21-Desoxy-6-methyl-9-fluor-prednisolon)
1-Dehydro-6-methyl-17-hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze (Methylprednisolon)
1-Dehydro-16-methylen-17-hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze (16-Methylen-prednisolon)
6-Fluor-16,17-dihydroxy-corticosteron und seine Aether (6-Fluor-16-hydroxy-hydrocortison)
9-Fluor-17-hydroxy-corticosteron und seine Ester (Fluor-hydrocortison)
17-Hydroxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze (Hydrocortison, Compound F)
— die wiederholte Abgabe der Cortisone zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist —
— ausgenommen: bis zu 20 g einer Zubereitung zum äußeren Gebrauch, die je g nicht mehr als 0,25 mg 1-Dehydro-6-methyl-9-fluor-17-hydroxy-21-desoxy-corticosteron (21-Desoxy-6-methyl-9-fluor-prednisolon) enthält —
Curare
Dekamethylen-bis-(methylcarbaminoyl-3-oxyphenyl-trimethylammonium-bromid)
Demethyl-chlortetracyclin und seine Salze
— die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist —
Desacetyl-methyl-kolchizin und seine Salze (Demecolcin)
Desferrioxamin B und seine Salze
11-Desoxycorticosteron und seine Ester und Glukosidverbindungen
Diacetyl-N-allyl-normorphin und seine Salze
1-[4′-(β-Diaethylamino-aethoxy)-phenyl]-1-(4′-tolyl)-2-(4′-chlorphenyl)-aethanol-(1) und seine Salze (Triparanol)
(N-Diaethylamino-N′-pyrrolidino)-diaethylaether-dijodmethylat
Diaethyldioxystilben-diphosphat
1,1-Diaethyl-3-hydroxy-pyrrolidinium-benzylsäure-ester-bromid (Benziloniumbromid)
Diaethyl-(4-nitro-phenyl)-phosphat
4,4′-Diamidino-diphenoxy-pentan und seine Salze (Pentamidin)
4,4′-Diamidino-diphenoxy-propan und seine Salze (Propamidin)
4,4′-Diamidino-2-oxy-stilben und seine Salze
4,4′-Diamidino-stilben und seine Salze
2,4-Diamino-azobenzol und seine Salze (Chrysoidin)
2,4-Diamino-5-(4′-chlorphenyl)-6-aethyl-pyrimidin und seine Salze (Pyrimethamin)
2,4-Diamino-5-phenyl-thiazol und seine Salze
4-[3-(5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-propyl]-1-piperazinaethanol und seine Salze
N,N-Dibenzyl-2-chloraethylamin und seine Salze
(+)-3,4-(1′,3′-Dibenzyl-2′-ketoimidazolido)-1,2-trimethylen-thiophanium-camphersulfonat (Trimethaphan-camphersulfonat)
2,2-Dichlor-1,1-difluor-aethyl-methyl-aether (Methoxyfluran)
4,4′-Dichlor-diphenyl-trichlormethyl-methan (DDT) — ausgenommen zum äußeren Gebrauch —
Digitalis-Wirkstoffe, genuine und teilabgebaute Glykoside
Diguanidine und ihre Salze zur Diabetesbehandlung
1,4-Dihydrazino-phthalazin und seine Salze
Dihydroergocornin und seine Salze

Dihydroergocristin und seine Salze
Dihydroergokryptin und seine Salze
Dihydroergotamin und seine Salze
Dihydrokuprein, seine Salze und Derivate sowie deren Salze
Dihydrostreptomycin und seine Salze
— die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist —
Dihydrotachysterin
L-3-(3′, 4′-Dihydroxyphenyl)-2-methylalanin und seine Salze (Methyldopa)
1-(3′, 4′-Dihydroxyphenyl)-2-[α-methyl-β-(3″, 4″-methylendioxyphenyl)-aethylamino]-aethanol und seine Salze (Protokylol)
4,4′-Diisoamyloxythiocarbanilid
1-(2′,5′-Dimethoxyphenyl)-2-aminopropanol-(1) (Methoxamin) und seine Salze
3,5-Dimethyl-5-aethyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze (Paramethadion)
(2-Dimethylamino-aethyl)-(2′-methylbenzhydryl)-aether und seine Salze (Orphenadrine)
5-(3′-Dimethylamino-2′-methylpropyl)-iminodibenzyl und seine Salze
5-(3′-Dimethylamino-propyliden)-dibenzo-[a,d]-[1,4]-cycloheptadien und seine Salze (Amitriptylin)
N-(3-Dimethylamino-propyl)-iminodibenzyl (Imipramin) und seine Salze
N-(3-Dimethylamino-propyl)-thiophenylpyridylamin und seine Salze (Prothipendyl)
Dimethylcarbaminoyl-3-oxyphenyltrimethylammonium-Salze (Neostigmin)
Dimethylcarbaminsäure-(1-methyl-3-oxypyridinum-bromid)-ester (Pyridostigminbromid)
1,3-Dimethylol-2-mercapto-benzimidazol
N-(2′,6′-Dimethyl-piperidino)-3-sulfamoyl-4chlor- benzoesäureamid und seine Salze (Chlosudimeprimyl)
2,4-Dioxo-3,3-diaethyl-tetrahydropyridin (Pyrithyldion)
2,2-Diphenyl-4-diisopropylamino-butyramid-methyl-jodid (Isopropamid)
1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidin und seine Salze (Phenylbutazon)
1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-(2′-phenylsulfinyl-aethyl)-pyrazolidin (Sulfinpyrazon)

Eisen-Verbindungen zur parenteralen Anwendung
Erythromycin, seine Salze und Ester sowie deren Salze

Fibrinolysin
1-[3-(4-Fluor-benzoyl)-propyl]-4-(2-oxo-1-benzimidazolinyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin und seine Salze (Dehydrobenzperidol)
4′-Fluor-4-[1-(4-hydroxy-4-[4′-chlorphenyl]-piperidino)]butyrophenon und seine Salze
4′-Fluor-4-[4′-hydroxy-4′-(tolyl-4″)-piperidino]-butyrophenon und seine Salze (Methylperidol)
4′-Fluor-4-[4-hydroxy-4-(3′-trifluormethyl-phenyl)-piperidino]-butyrophenon und seine Salze (Triperidol)
4′-Fluor-4-[N′-(2″-methoxyphenyl)-piperazino]-butyrophenon und seine Salze (Haloanison)
Fluorphosphorsäure-di-isopropyl-ester
4′-Fluor-4-(N-[4′-(N-piperidino)-4′-carbamido]-piperidino)-butyrophenon und seine Salze
Framycetin und seine Salze
— ausgenommen Zubereitungen zur örtlichen Anwendung auf Haut oder Schleimhaut, sofern sie je Stück abgeteilter Arzneiform (z. B. Pastillen) oder bei sonstigen Zubereitungen je Gramm oder Milliliter nicht mehr als 5 mg Framycetin enthalten —

Galanthamin und seine Salze
Glukagon und seine Salze
Goldverbindungen, organische, soweit es sich handelt um:
Aurothioglukose
Goldkeratinat
Griseofulvin
Guanidin und seine Salze, auch an Eiweiß gebunden
Guanidine, einfach substituierte, und ihre Salze zur Diabetesbehandlung

Hexachlorcyclohexan (HCC, HCH)
— ausgenommen zum äußeren Gebrauch —
1,6-Hexamethylen-bis-(carbaminoylcholinbromid)
Hexamethylen-bis-[methylcarbaminsäure-(1-methyl-3-oxy-pyridinium-bromid)-ester]
Histamin und seine Salze — ausgenommen:
1. Zubereitungen zum oralen Gebrauch, sofern sie je Gramm oder Milliliter nicht mehr als 0,4 mg Histaminsalz enthalten und tropfenweise eingenommen werden sollen
2. Zubereitungen zum äußeren Gebrauch —
Hydantoin, seine Salze und Derivate sowie deren Salze — ausgenommen Allantoin und seine Salze —
17β-Hydroxy-androstane, soweit es sich handelt um:
17β-Hydroxy-androstan-3-on (Stanolon)
17β-Hydroxy-17α-methyl-androstan-(3,2-c)-pyrazol (Stanazol)
17β-Hydroxy-androstene, soweit es sich handelt um:
1α,7α-Bis-(acetylthio-17β-hydroxy-17α-methyl-Δ^4-androsten-3-on und seine Ester
17β-Dihydroxy-17α-methyl-Δ^4-androsten-3-on und seine Ester
17β-Hydroxy-4-chlor-Δ^4-androsten-3-on und seine Ester
17β-Hydroxy-17α-methyl-$\Delta^{1,4}$-androstadien-3-on und seine Ester (Methandrostenolon)
17β-Hydroxy-1-methyl-Δ^1-androsten-3-on (Methenolon) und seine Ester

17β-Hydroxy-nor-androstene, soweit es sich handelt um:
4,17β-Dihydroxy-19-nor-Δ⁴-androsten-3-on und seine Ester
17β-Hydroxy-17α-aethyl-19-nor-Δ⁴-androsten und seine Salze (Aethylestrenol)
17β-Hydroxy-19-nor-Δ⁴-androsten-3-on (Nor-Androstenolon; Nandrolon) und seine Ester
2-(β-Hydroxyphenylaethylamino)-pyridin (Phenyramidol) und seine Salze
21-Hydroxy-pregnan-3,20-dion (Hydroxydion) und seine Ester sowie deren Salze
Hypertensin

Isonikotinaldehyd und seine Derivate
Isonikotinsäurehydrazid, seine Salze und Derivate sowie deren Salze (INH, Isoniazid)
N-Isopropyl-2-methyl-2-n-propyl-1,3-propandiol-dicarbamat und seine Salze (Carisoprodol)
*5-Jod-2′-desoxyuridin
Jodverbindungen, organische, als Röntgenkontrastmittel

Kanamycin und seine Salze

Lespedeza capitata und die daraus hergestellten Zubereitungen

6-Mercaptopurin
2-(2′-Methoxyaethyl)-pyridin und seine Salze (Methyridin)
3-Methoxy-4-(N,N-diaethylcarbamoylmethoxy)-phenyl-essigsäure-propylester
3-(4′-Methoxyphenyl)-4,5-dithia-cyclopenten-(2)-thion-(1) (Anetholtrithion)
3-(o-Methoxyphenoxy)-2-hydroxy-1-propylcarbamat (Methocarbamol)
2-(3′-Methoxypropyl-aminomethyl)-1,4-benzodioxan und seine Salze
6-Methoxytropin-benzilsäureester-brom-methylat (Tropenzilium)
2-Methyl-3-(o-aethylphenyl)-4-chinazolinon und seine Salze
α,α-Methylaethyl-succinimid (Ethosuximid)
3-Methylamino-isocamphan und seine Salze (Mecamylamine)
5-(3′-Methylaminopropyliden)-dibenzo-(a, d)-(1,4)-cycloheptadien (Nortriptylin) und seine Salze
N-(3-Methylaminopropyl)-iminodibenzyl (Desmethylimipramin) und seine Salze
1-Methyl-3-benziloylhydroxy-chinuclidinium-bromid (Clidinium-bromid)
N-(4-Methyl-benzolsulfonyl)-N′-n-butylharnstoff und seine Salze
Methyl-bis-(2-chloraethyl)-amin und seine Salze (N-Lost)
Methyl-bis-(2-chloraethyl)-amin-N-oxyd und seine Salze (N-Oxyd-Lost)
4-Methyl-5-(2′-chloraethyl)-thiazol und seine Salze (Chloraethiazol)
3-Methyl-3,4-dihydroxy-4-phenyl-butin-(1)
3,3′-Methylen-bis-(4-oxycumarin)
Methylergoblastin (Methylergonovin) und seine Salze
1-Methyl-D-lysergsäure-(+)-butanol-(1)-amid-(2) (Methysergid) und seine Ester
1-Methyl-2-mercapto-imidazol (Methimazole)
2-Methyl-3-(2′-methyl-3′-chlorphenyl)-4(3H)-chinazolinon und seine Salze (3′-Chlor-methaqualon)
N-Methyl-α,α-methylphenylsuccinimid (Methsuximid)
3-Methyl-pentanol-(3)-carbamat (Emylcamat)
3-Methyl-pentin-(1)-ol-(3) und seine Ester (Metylpentynol)
1-(2′-Methylphenoxy)-propan-2,3-diol (Mephenesin)
7-[2′-(1″-Methyl-2″-phenyl-aethylamino)-aethyl]-theophyllin und seine Salze (7-Aethyltheophyllin-amphetamin)
N-Methyl-α-phenyl-succinimid
1-Methyl-4-[N′-phenyl-N′-(2″-thenyl)-amino]-piperidin und seine Salze (Thenalidin)
1-(N-Methyl-piperidyl-4′)-3-phenyl-4-aethyl-pyrazolon-5 (Piperylon) und seine Salze
2-Methyl-2-n-propyl-1,3-propandiol-dicarbamat (Meprobamat)
N-Methyl-skopolamin (N-Methyl-hyoszin) und seine Salze
(1-Methyl-1,4,5,6-tetrahydro-pyrimidyl-2)-methyl-α-cyclohexyl-α-phenyl-glycolat und seine Salze (Oxyphencyclimin)
2-Methyl-3-o-tolyl-4-chinazolinon und seine Salze (Methaqualon)
Mitomycin C

β-Naphthyl-bis-(2-chloraethyl)-amin und seine Salze
Natriumaethylmercurithiosalicylat
— ausgenommen Tabletten bis zu 30 mg **Natriumaetylmercurithiosalicylat**, die zur Bekämpfung der Nosemaseuche bestimmt sind —
Natriumantimonyltartrat
Neomycin A, B und C und ihre Salze
— ausgenommen Zubereitungen zur örtlichen Anwendung auf Haut oder Schleimhaut, sofern sie je Stück abgeteilter Arzneiform (Pastillen, Tabletten, Ovula u. ä.) oder bei sonstigen Zubereitungen je Gramm oder Milliliter nicht mehr als 5 mg Neomycin enthalten —
5-Nitro-2-furaldehyd-semicarbazon (Nitrofurazon, Nitrofural)
N-(5-Nitrofurfuryliden)-3-amino-2-oxazolidon (Furazolidon)
3-[α-(4′-Nitrophenyl)-β-acetyl-aetyl]-4-oxycumarin (Acenocumarol)
d(-)-threo-1-(4′-Nitrophenyl)-2-acido-acetamido-1,3-propandiol, seine Ester und Verbindungen (Azidoamphenicol)
Novobiocin und seine Salze

[2-(Oktahydro-1′-azocinyl)-aethyl]-guanidin und seine Salze (Guanethidin)
Oleander-Glykoside
Oleandomycin und seine Salze

3-(3-Oxo-7α-acetylthio-17β-hydroxy-4-androsten-17α-yl)-propionsäure-γ-lacton (Spironolacton)
1-Oxo-3-(3′-sulfamyl-4′-chlor-phenyl)-3-hydroxy-isoindolin und seine Salze
4-Oxy-3-(α-phenyl-propyl)-cumarin
Oxytetracyclin und seine Salze
— die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist —

Paramomycin und seine Salze
Pentamethylen-1,5-bis-(N-methyl-pyrrolidinium)-Salze (Pentoloniumsalze)
β,β-Pentamethylen-γ-hydroxy-buttersäure (Hexacyclonsäure) und ihre Salze
N,N,N′,N′-3-Pentamethyl-N,N′-diaethyl-3-aza-pentylen-1,5-diammonium und seine Salze
Perchlorsäure und ihre Salze
Phenothiazin
Phenothiazin, am Stickstoff substituiertes, seine Salze und Derivate sowie deren Salze
3-[α-Phenyl-β-acetyl-aethyl]-4-oxycumarin und seine Salze (Warfarin)
Phenylacetylharnstoff und seine Salze (Phenacemid)
Phenylaethylessigsäure-(2-phenyl-3-methyl-morpholino-N-aethanol)-ester und seine Salze
2-Phenyl-2-aethyl-glutarimid (Glutethimid)
5-Phenyl-5-aethyl-hexahydropyrimidin-4,6-dion und seine Salze (Pyrimidon)
β-Phenylaethyl-hydrazin und seine Salze
1-(2′-Phenylaethyl)-4-(N-propionyl-anilino)-piperidin und seine Salze (Phentanyl)
2-Phenylchinolin-4-carbonsäure, ihre Salze und Ester (Cinchophen)
1-Phenyl-cyclopentan-carbonsäure-(1)-(2-diaethylaminoaethyl)-ester und seine Salze
trans-d,l-2-Phenyl-cyclopropylamin und seine Salze (Tranylcypromin)
1-Phenyl-1-(2′-diaethylamino-aethyl)-glutarimid und seine Salze
1-Phenyl-2-dimethylamino-propan und und seine Salze
D-2-Phenyl-3,4-dimethyl-1,4-tetrahydro-oxazin (Phendimetrazin) und seine Salze
1-Phenyl-2-(p-hydroxyphenyl)-3,5-dioxo-4-n-butyl-pyrazolidin und seine Salze
5-Phenyl-2-imino-4-oxo-oxazolidin und seine Salze
2-Phenylindandion-(1,3) (Phenindion)
β-Phenylisopropyl-hydrazin und seine Salze
2-Phenyl-3-methyl-morpholin, seine Salze und Verbindungen mit Purinen
1-Phenyl-1-(2′-piperidyl)-1-acetoxy-methan (Essigsäure-(phenyl-2-piperidyl)-methylester)
Phenyl-piperidyl-(2)-essigsäure-methylester und seine Salze
3-Phenyl-1-propanol-carbamat (Phenprobamatum)
Phosphorsäure-methyl-(2-chlor-4-tertiärbutyl-phenyl)-di-ester-methylamid
— die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist —
N-Phthalyl-glutaminsäureimid und seine Salze (Thalidomid)
Piperazin (auch als Hydrat) und seine Salze, als Wurmmittel für den Menschen
(2-Piperidyl)-benzhydrol und seine Salze (Pipradrol)
3-(1′-Piperidyl)-1,1-diphenyl-1-propanol und seine Salze
3-(1′-Piperidyl)-1-phenyl-1-bicycloheptenyl-propanol-(1) und seine Salze
3-(1′-Piperidyl)-1-phenyl-1-cyclohexyl-propanol-(1) und seine Salze (Trihexylphenidyl)
2-(1-Piperidylmethyl)-1,4-benzodioxan und seine Salze
Podophylli emodi, Radix et Rhizoma
Podophylli peltati, Radix et Rhizoma
Podophyllin
Podophyllinsäure, ihre Salze und Derivate sowie deren Salze (z. B. Podophyllinsäure-aethylhydrazid)
Podophyllotoxin
Podophyllum-emodi- und Podophyllum-peltatum-Glykoside und ihre Derivate
Polymethoniumverbindungen und ihre Salze
Polymyxin B und seine Salze
— die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist —
Propionsäure-(3′-dimethylamino-2′-methyl-1′-phenyl-1′-benzyl-propyl)-ester und seine Salze (Propoxyphen)
4-Propylaminobenzoesäure-(3′-dimethylamino-2′-oxypropyl)-ester und seine Salze
Proteolytische Enzyme tierischen oder pflanzlichen Ursprungs zur parenteralen Injektion
Pteroyl-triglutaminsäure und ihre Salze
Pyrazincarbonsäureamid und seine Salze (Pyrazinamid)
Pyrophosphorsäure-tetraisopropyl-ester
Pyrrolidino-methyl-tetracyclin und seine Salze
3-Pyrrolidino-1-phenyl-1-cyclohexyl-propanol-(1) und seine Salze (Procyclidin)

Rauwolfia-Alkaloide und ihre Salze

Schilddrüsen-Wirkstoffe und ihre Salze (z. B. Dijodtyrosin, Thyroxin, Trijodthyronin)
Scilla-Glykoside
Secale cornutum
Secale-Alkaloide und ihre Salze
Selen-Verbindungen
Streptokinase — ausgenommen zur buccalen oder oralen Anwendung auch im Gemisch mit Streptodornase —
Streptomycin und seine Salze
— die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist —

Strychnin-N-oxyd und seine Salze
Strychninsäure und ihre Salze
N-(4′-Sulfamyl-phenyl)-butansultam-(1,4) und seine Salze

Tetraaethylammonium und seine Salze
Tetraaethyl-thiuram-disulfid
Tetrachloraethylen
— ausgenommen zum äußeren Gebrauch —
4,5,6,7-Tetrachlor-2-(trimethylammonium-aethyl)-N-methyl-isoindolinium-dichlorid (Chlorisondamin)
Tetracyclin und seine Verbindungen
— die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist —
Thalliumsalze
Thevetin (aus Thevetia neriifolia)
Thiobarbitursäure-Derivate und ihre Salze
Thiophosphorsäure-0-(4-dimethylsulfamoyl-phenyl)-0,0-dimethylester
Thiophosphorsäure-0-(2,4,5-trichlorphenyl)-0,0-dimethylester
— die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist —
Thiouracil und seine Derivate
D-Thyroxin und seine Salze
2-(N-4-Tolyl-N-3-oxyphenyl-aminomethyl)-imidazolin
2,4,7-Triamino-6-phenyl-pteridin (Triamteren)
2,2,2-Tribrom-aethanol-(1)
1,1,2-Trichloraethylen
— ausgenommen zum äußeren Gebrauch —
1,1,2-Trichlor-butyraldehyd-hydrat (Butylchloralhydrat)
(2,2,2-Trichlor-1-hydroxy-aethyl)-phosphonsäure-dimethylester
— die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist —
3,12,16-Trihydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-17[1′-carboxy-isohept-4′-enyliden-(1′)]-cyclopentanoperhydrophenanthren-16-acetat (Fusidinsäure) seine Salze und Ester
N-(3-Trimethylammonium-propyl)-N-methylcamphidinium-di-methylsulfat
3,5,5-Trimethyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze (Trimethadion)
2,3,5-Tris-aethylenimino-benzochinon-(1,4)
2,4,6-Tris-(aethylenimino)-1,3,5-triazin (Triaethylenmelamin)
Tris-(2-chloraethyl)-amin und seine Salze
N,N,O-Tris-(2-chloraethyl)-N′-(3-hydroxypropyl)-phosphorsäure-ester-diamid
2,4,6-Tris-(methylolamino)-1,3,5-triazin (Trimethylolmelamin)
1,2,3-Tris-(2-triaethylammonium-aethoxy)-benzol-Salze
Tropasäure-(N-aethyl-N-4-picolyl)-amid
d-Tubocurarin und seine Salze
d-Tubocurarin-dimethylaether und seine Salze (Dimethyl-d-tubocurarin)
Vancomycin und seineSalze
Veratrum-Alkaloide und ihre Salze
Vinblastin (Vinkaleukoblastin) und seine Salze
Viomycin und seine Salze

Xanthencarbonsäure-diaethylamino-aethyl-ester-methylbromid
Xanthocillin und seine Salze

Yohimboasäure, ihre Salze und Ester sowie deren Salze

Zyanessigsäurehydrazid und seine Salze

Fortlaufender Bezug durch die Postanstalten. Der Bezugspreis beträgt jährlich 11,08 DM. Einzelstücke können vom Verlag Dr. Max Gehlen, 6380 Bad Homburg vor der Höhe, Postfach 66, bezogen werden. Die vorliegende Ausgabe Nr. 19 kostet 50 Pf zuzüglich 20 Pf Versandkosten. — Herausgegeben von der Hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden. — Verlag Dr. Max Gehlen, 6380 Bad Homburg vor der Höhe, Postfach 66, Ruf: Samm.-Nr. (0 61 72) 2 30 56, Postsch.-Kto.: Dr. Max Gehlen 71999, Frankfurt (Main)
Druck: Werk- und Feindruckerei Dr. Alexander Krebs, Bad Homburg vor der Höhe und Weinheim (Bergstraße)
Die Auslieferung von Einzelstücken älterer Ausgaben erfolgt auch dann durch den Verlag Dr. Max Gehlen, 6380 Bad Homburg vor der Höhe, Postfach 66, wenn der Wiesbadener Kurier als Verlag angegeben ist.